



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 618 225 A1**

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑪ Anmeldenummer: 94104395.2

⑪ Int. Cl.⁵: **C07K 5/06, C07K 5/08,
C07K 5/10, C07K 7/06,
C07K 7/08, A61K 37/02**

⑫ Anmeldetag: 21.03.94

⑬ Priorität: 01.04.93 DE 4310632

⑭ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.10.94 Patentblatt 94/40

⑮ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL
PT SE

⑯ Anmelder: **MERCK PATENT GmbH**
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE)

⑰ Erfinder: **Jonczyk, Alfred, Dr.**
Scheppallee 57
D-64295 Darmstadt (DE)
Erfinder: **Diefenbach, Beate**
Beckerstrasse 33
D-64289 Darmstadt (DE)
Erfinder: **Felding-Habermann, Brunhilde, Dr.,**
c/o BFH Program
Vascular Bio, SBR 8,
The Scripps Res. Inst. 10666
N Torrey Pines Rd, La Jolla, CA 92 037 (US)

⑱ **Lineare Adhäsionsinhibitoren.**

⑲ Die Erfindung betrifft neue lineare Peptide der Formel I

X-A-B-C-Arg-E-G-L-Z I,

worin A, B, C, E, G, L, X und Z die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung besitzen, sowie deren Salze.

Diese Verbindungen wirken als Integrin-Inhibitoren und können insbesondere zur Prophylaxe und Behandlung von Erkrankungen des Kreislaufs und der Tumorthherapie verwendet werden.

EP 0 618 225 A1

Die Erfindung betrifft neue lineare Peptide der Formel I

X-A-B-C-Arg-E-G-L-Z I,

5 worin

X	H, Acyl mit 1-10 C-Atomen, H-Asn, H-Val-Asn, H-Asp-Val-Asn, Fmoc-Gly-Gly, H-Lys-Gly-Gly, H-Lys-Pro, H-Tyr-Gly-Gly, H-Cys-Gly-Gly, H-Cys(Trt)-Gly-Gly, H-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn oder H-Thr-Asp-Val-Asn,
A, B und C	jeweils unabhängig voneinander fehlen oder einen Aminosäurerest, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus Ala, Arg, Asn, Asp, Asp(OR), Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Lys(Ac), Lys(AcNH ₂), Lys(AcSH), Met, Orn, Phe, 4-Hal-Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr oder Val, wobei die genannten Aminosäurereste auch derivatisiert sein können,
E	Gly, His oder Leu-His,
G	fehlt oder Asp oder Asn,
15 L	fehlt oder Gly, Ile, Leu oder Leu-Leu,
Z	NH ₂ oder OH,
Hal	F, Cl, Br, I und
Ac	Alkanoyl mit 1-10 C-Atomen

bedeuten,

20 sowie deren physiologisch unbedenkliche Salze.

Ähnliche Verbindungen sind beispielsweise aus der europäischen Patentanmeldung EP 0 406 428 bekannt.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, neue Verbindungen mit wertvollen Eigenschaften aufzufinden, insbesondere solche, die zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet werden können.

25 Es wurde gefunden, daß die Verbindungen der Formel I und ihre Salze sehr wertvolle Eigenschaften besitzen. Vor allem wirken sie als Integrin-Inhibitoren, wobei sie insbesondere die Wechselwirkungen der β_3 -Integrin-Rezeptoren mit Liganden hemmen. Diese Wirkung kann z.B. nach der Methode nachgewiesen werden, die von J.W. Smith et al. in J. Biol. Chem. 265, 12267-12271 (1990) beschrieben wird. Zusätzlich treten antiinflammatorische Effekte auf. Auch diese Wirkung kann mit Hilfe von literaturbekannten Methoden

30 nachgewiesen werden.

Die Verbindungen können als Arzneimittelwirkstoffe in der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt werden, insbesondere zur Prophylaxe und zur Behandlung von Erkrankungen des Kreislaufs, bei Thrombose, Herzinfarkt, Arteriosklerose, Entzündungen, Apoplexie, Angina pectoris, Tumoren, osteolytischen Erkrankungen, insbesondere Osteoporose, Angiogenese und Restenose nach Angioplastie. Ferner können sie

35 unterstützend bei Wundheilungsprozessen wirken.

Die Verbindungen eignen sich zudem als antimikrobielle Wirkstoffe der Infektionen, wie sie beispielsweise durch Bakterien, Pilze oder Hefen ausgelöst werden können, verhindern. Die Substanzen können daher vorzugsweise als begleitende antimikrobielle Wirkstoffe gegeben werden, wenn Eingriffe an Organismen vorgenommen werden, bei denen körperfremde Stoffe, wie z.B. Biomaterialien, Implantate, Katheter

40 oder Herzschrittmacher, eingesetzt werden. Sie wirken als Antiseptika.

Die vor- und nachstehend aufgeführten Abkürzungen von Aminosäureresten stehen für die Reste folgender Aminosäuren:

Ala	Alanin
Arg	Arginin
45 Asn	Asparagin
Asp	Asparaginsäure
Asp(OR)	Asparaginsäure(β -ester)
Cit	Citrullin
Cys	Cystein
50 Dab	2,4-Diaminobuttersäure
Gln	Glutamin
Glu	Glutaminsäure
Gly	Glycin
His	Histidin
55 Ile	Isoleucin
Leu	Leucin
Lys	Lysin
Lys(Ac)	N-Acyllysin

	Lys(AcNH ₂)	Nε-Aminoacyllysin
	Lys(AcSH)	Nε-Mercaptoacyllysin
	Met	Methionin
	Orn	Ornithin
5	Phe	Phenylalanin
	4-Hal-Phe	4-Halogenphenylalanin
	Pro	Prolin
	Ser	Serin
	Thr	Threonin
10	Trp	Tryptophan
	Tyr	Tyrosin
	Val	Valin.
	Ferner bedeuten nachstehend:	
	BOC	tert-Butoxycarbonyl
15	CBZ	Benzyloxycarbonyl
	DCCI	Dicyclohexylcarbodiimid
	DMF	Dimethylformamid
	EDCI	N-Ethyl-N'-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimidhydrochlorid
	Et	Ethyl
20	Fmoc	9-Fluorenylmethoxycarbonyl
	HOBt	1-Hydroxybenzotriazol
	Me	Methyl
	MBHA	4-Methyl-benzhydrylamin
	Mtr	4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-sulfonyl
25	OBu	tert.-Butylester
	OMe	Methylester
	OEt	Ethylester
	POA	Phenoxyacetyl
	TFA	Trifluoressigsäure.
30	Trt	Trityl (Triphenylmethyl)

Sofern die vorstehend genannten Aminosäuren in mehreren enantiomeren Formen auftreten können, so sind vor- und nachstehend, z.B. als Bestandteil der Verbindungen der Formel I, alle diese Formen und auch ihre Gemische (z.B. die DL-Formen) eingeschlossen. Ferner können die Aminosäuren bzw. die Aminosäurereste in an sich bekannter Form derivatisiert sein.

35 Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 oder eines ihrer Salze, dadurch gekennzeichnet, daß man sie aus einem ihrer funktionellen Derivate durch Behandeln mit einem solvolysierenden oder hydrogenolysierenden Mittel in Freiheit setzt oder daß man ein Peptid der Formel II

40 M-OH II

worin
M

- 45 (a) X, aber nicht Wasserstoff, Fmoc-Gly, H-Lys-Gly, H-Lys, H-Tyr-Gly, H-Asp-Val, H-Tyr, H-Val, H-Asp, H-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val, H-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp, H-Cys-Gly-Gly-Thr, H-Cys-Gly-Gly, H-Cys-Gly, H-Cys, H-Cys(Trt)-Gly, H-Cys(Trt), H-Thr-Asp-Val, H-Thr-Asp oder H-Thr,
- (b) X-A,
- (c) X-A-B,
- (d) X-A-B-C,
- 50 (e) X-A-B-C-Arg,
- (f) X-A-B-C-Arg-E oder
- (g) X-A-B-C-Arg-E-G

bedeutet,
mit einer Aminoverbindung der Formel III

55 H-Q-Z III

worin Z die angegebene Bedeutung besitzt und gegebenenfalls durch eine entsprechende Schutzgruppe

geschützt sein kann und

Q

- (a) A-B-C-Arg-E-G-L, Asn-A-B-C-Arg-E-G-L Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, Pro-A-B-C-Arg-E-G-L, Gly-A-B-C-Arg-E-G-L, Gly-Gly-A-B-C-Arg-E-G-L, Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, Thr-Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, Gly-Thr-Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L oder Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L,
 (b) B-C-Arg-E-G-L,
 (c) C-Arg-E-G-L,
 (d) Arg-E-G-L,
 (e) E-G-L,
 (f) G-L oder
 (g) L

bedeutet,
 umsetzt

- und/oder daß man gegebenenfalls eine freie Aminogruppe acyliert und/oder eine Verbindung der Formel I durch Behandeln mit einer Säure oder einer Base in eines ihrer Salze überführt.

Vor- und nachstehend haben die Reste A, B, C, E, G, L, M, Q, X und Z die bei den Formeln I, II und III angegebenen Bedeutungen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.

In den vorstehenden Formeln steht Alkyl vorzugsweise für Methyl, Ethyl, Isopropyl oder tert.-Butyl.

- X ist vorzugsweise Wasserstoff, H-Asn, Fmoc-Gly-Gly oder H-Cys(Trt)-Gly-Gly, besonders bevorzugt aber H-Cys-Gly-Gly. Ferner kann X auch Acyl mit 1-10 C-Atomen sein, wobei Acyl vorzugsweise Alkanoyl mit 1-8, insbesondere 1, 2, 3, oder 4 C-Atomen bedeutet, in einzelnen bevorzugt Formyl, Acetyl, Propionyl, Butyryl, Isobutyryl, Pentanoyl oder Hexanoyl, aber auch Aryl-CO, wie z.B. Benzoyl, o-, m- oder p-Toluy, o-, m- oder p-Methoxybenzoyl sowie 2-Naphthoyl oder aber Aryl-C_nH_{2n}-CO (n = 1-4), wie z.B. Ph-CH₂-CO, Ph-(CH₂)₂-CO, Ph-(CH₂)₃-CO oder Ph-(CH₂)₄-CO (Ph = Phenyl), wobei Ph auch durch eine OCH₃- oder CH₃-Gruppe substituiert sein kann.

- Die Gruppe A ist vorzugsweise Ala, Leu, Ser, insbesondere Gly oder aber nicht vorhanden. B ist vorzugsweise Asn oder Asp. C ist vorzugsweise Ala, auch D-Ala, His und insbesondere Gly. E ist vorzugsweise Gly oder His. G ist bevorzugt Asp, während L vorzugsweise für Leu steht. Z bedeutet NH₂, besonders bevorzugt aber OH.

Dementsprechend sind Gegenstand der Erfindung insbesondere diejenigen Verbindungen der Formel I, in denen mindestens einer der genannten Reste eine der vorstehend angegebenen bevorzugten Bedeutungen hat.

- Eine bevorzugte Gruppe von Verbindungen kann durch die Formel Ia ausgedrückt werden, die der Formel I entspricht und worin B, C, E, X und Z die dort angegebenen Bedeutungen besitzen und

A Gly,
 G Asp und
 L Leu bedeuten.

- Eine weitere Gruppe von bevorzugten Verbindungen kann durch die Teilformeln Iaa bis Iad ausgedrückt werden, die sonst der Formel I bzw. Ia entsprechen, worin jedoch in Iaa:

X Wasserstoff oder Acetyl
 A Gly,
 B Asn oder Asp,
 C fehlt, Ala oder Gly,
 E Gly oder His,
 G Asp,
 L Leu und
 Z NH₂ oder OH,

in Iab:

- X Wasserstoff oder Acyl,
 A fehlt oder Gly,
 B fehlt oder Asn,
 C Gly,
 E Gly oder His,
 G Asp,
 L Leu und
 Z NH₂ oder OH,

in Iac:

- X Wasserstoff,
 A fehlt oder Gly
 B fehlt oder Asn
 C fehlt oder Gly
 5 E Gly oder His
 G Asp
 L Leu und
 Z OH oder NH₂.

in lad:

- 10 X H-Asn, H-Val-Asn, H-Asp-Val-Asn, Fmoc-Gly-Gly, H-Lys-Gly-Gly, H-Tyr-Gly-Gly, H-Cys(Trt)-Gly-Gly, H-Cys-Gly-Gly, H-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn oder H-Thr-Asp-Val-Asn,
 A Gly,
 B Asn,
 C Gly,
 15 E Gly oder His,
 G Asp,
 L Leu und
 Z NH₂ oder OH

bedeuten.

- 20 Besonders geeignete Verbindungen sind solche, die der Formel I entsprechen und worin A, B, C, X und Z die zuvor angegebenen bevorzugten Bedeutungen besitzen, worin aber der zentrale Aminosäurerest für L-Arg, nicht für D-Arg, E für Gly sowie His, nicht für D-His, G für Asp und L für Leu stehen.

- Die Verbindungen der Formel I und auch die Ausgangsstoffe zu ihrer Herstellung werden im übrigen nach bekannten Methoden hergestellt, wie sie in der Literatur (z. B. in den Standardwerken wie Houben-
 25 Weyl, Methoden der organischen Chemie, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart) beschrieben sind und zwar unter Reaktionsbedingungen, die für die genannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind. Dabei kann man auch von bekannten, hier nicht näher erwähnten Varianten Gebrauch machen.

Die Ausgangsstoffe können, falls erwünscht, auch in situ gebildet werden, so daß man sie aus dem Reaktionsgemisch nicht isoliert, sondern sofort weiter zu den Verbindungen der Formel I umsetzt.

- 30 Die Verbindungen der Formel I können erhalten werden, indem man sie aus ihren funktionellen Derivaten durch Solvolyse, insbesondere Hydrolyse, oder durch Hydrogenolyse in Freiheit setzt.

- Bevorzugte Ausgangsstoffe für die Solvolyse bzw. Hydrogenolyse sind solche, die anstelle einer oder mehrerer freier Amino- und/oder Hydroxygruppen entsprechende geschützte Amino- und/oder Hydroxygruppen enthalten, vorzugsweise solche, die anstelle eines H-Atoms, das mit einem N-Atom verbunden ist,
 35 eine Aminoschutzgruppe tragen, z. B. solche, die der Formel I entsprechen, aber anstelle einer NH₂-Gruppe eine NHR'-Gruppe (worin R' eine Aminoschutzgruppe bedeutet, z. B. BOC oder CBZ) enthalten.

Ferner sind Ausgangsstoffe bevorzugt, die anstelle des H-Atoms einer Hydroxygruppe eine Hydroxyschutzgruppe tragen, z. B. solche, die der Formel I entsprechen, aber anstelle einer Hydroxyphenylgruppe eine R''O-phenylgruppe enthalten (worin R'' eine Hydroxyschutzgruppe bedeutet).

- 40 Es können auch mehrere - gleiche oder verschiedene - geschützte Amino- und/oder Hydroxygruppen im Molekül des Ausgangsstoffes vorhanden sein. Falls die vorhandenen Schutzgruppen voneinander verschieden sind, können sie in vielen Fällen selektiv abgespalten werden.

- Der Ausdruck "Aminoschutzgruppe" ist allgemein bekannt und bezieht sich auf Gruppen, die geeignet sind, eine Aminogruppe vor chemischen Umsetzungen zu schützen (zu blockieren), die aber leicht
 45 entfernt werden können, nachdem die gewünschte chemische Reaktion an anderen Stellen des Moleküls durchgeführt worden ist. Typisch für solche Gruppen sind insbesondere unsubstituierte oder substituierte Acyl-, Aryl-, Aralkoxymethyl- oder Aralkylgruppen. Da die Aminoschutzgruppen nach der gewünschten Reaktion (oder Reaktionsfolge) entfernt werden, ist ihre Art und Größe im übrigen nicht kritisch; bevorzugt werden jedoch solche mit 1-20, insbesondere 1-8 C-Atomen. Der Ausdruck "Acylgruppe" ist im Zusammenhang mit
 50 dem vorliegenden Verfahren und den vorliegenden Verbindungen in weitestem Sinne aufzufassen. Er umschließt von aliphatischen, araliphatischen, aromatischen oder heterocyclischen Carbonsäuren oder Sulfonsäuren abgeleitete Acylgruppen sowie insbesondere Alkoxycarbonyl-, Aryloxycarbonyl- und vor allem Aralkoxycarbonylgruppen. Beispiele für derartige Acylgruppen sind Alkanoyl wie Acetyl, Propionyl, Butyryl; Aralkanoyl wie Phenylacetyl; Aroyl wie Benzoyl oder Toluyl; Aryloxyalkanoyl wie POA; Alkoxycarbonyl wie Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, 2,2,2-Trichlorethoxycarbonyl, BOC, 2-Jodethoxycarbonyl; Aralkyloxycarbonyl wie CBZ ("Carbobenzoxy"), 4-Methoxybenzyloxycarbonyl, FMOC; Arylsulfonyl wie Mtr. Bevorzugte
 55 Aminoschutzgruppen sind BOC und Mtr, ferner CBZ, Fmoc, Benzyl und Acetyl.

Der Ausdruck "Hydroxyschutzgruppe" ist ebenfalls allgemein bekannt und bezieht sich auf Gruppen, die geeignet sind, eine Hydroxygruppe vor chemischen Umsetzungen zu schützen, die aber leicht entfernbar sind, nachdem die gewünschte chemische Reaktion an anderen Stellen des Moleküls durchgeführt worden ist. Typisch für solche Gruppen sind die oben genannten unsubstituierten oder substituierten Aryl-, Aralkyl- oder Acylgruppen, ferner auch Alkylgruppen. Die Natur und Größe der Hydroxyschutzgruppen ist nicht kritisch, da sie nach der gewünschten chemischen Reaktion oder Reaktionsfolge wieder entfernt werden; bevorzugt sind Gruppen mit 1-20, insbesondere 1-10 C-Atomen. Beispiele für Hydroxyschutzgruppen sind u.a. Benzyl, p-Nitrobenzoyl, p-Toluolsulfonyl und Acetyl, wobei Benzyl und Acetyl besonders bevorzugt sind. Die COOH-Gruppen in Asparaginsäure und Glutaminsäure werden bevorzugt in Form ihrer tert.-Butylester geschützt (z.B. Asp (OBu)).

Die als Ausgangsstoffe zu verwendenden funktionellen Derivate der Verbindungen der Formel I können nach üblichen Methoden der Aminosäure- und Peptidsynthese hergestellt werden, wie sie z. B. in den genannten Standardwerken und Patentanmeldungen beschrieben sind, z. B. auch nach der Festphasenmethode nach Merrifield (B.F. Gysin u. R.B. Merrifield, J. Am. Chem. Soc. 94, 3102ff. (1972)).

Das In-Freiheit-Setzen der Verbindungen der Formel I aus ihren funktionellen Derivaten gelingt - je nach der benutzten Schutzgruppe - z. B. mit starken Säuren, zweckmäßig mit TFA oder Perchlorsäure, aber auch mit anderen starken anorganischen Säuren wie Salzsäure oder Schwefelsäure, starken organischen Carbonsäuren wie Trichloressigsäure oder Sulfonsäuren wie Benzol- oder p-Toluolsulfonsäure. Die Anwesenheit eines zusätzlichen inerten Lösungsmittels ist möglich, aber nicht immer erforderlich. Als inerte Lösungsmittel eignen sich vorzugsweise organische, beispielsweise Carbonsäuren wie Essigsäure, Ether wie Tetrahydrofuran oder Dioxan, Amide wie DMF, halogenierte Kohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, ferner auch Alkohole wie Methanol, Ethanol oder Isopropanol sowie Wasser. Ferner kommen Gemische der vorgenannten Lösungsmittel in Frage. TFA wird vorzugsweise im Überschuß ohne Zusatz eines weiteren Lösungsmittels verwendet, Perchlorsäure in Form eines Gemisches aus Essigsäure und 70%iger Perchlorsäure im Verhältnis 9 : 1. Die Reaktionstemperaturen für die Spaltung liegen zweckmäßig zwischen etwa 0 und etwa 50°, vorzugsweise arbeitet man zwischen 15 und 30° (Raumtemperatur).

Die Gruppen BOC, OBu und Mtr können z. B. bevorzugt mit TFA in Dichlormethan oder mit etwa 3 bis 5 n HCl in Dioxan bei 15-30° abgespalten werden, die Fmoc-Gruppe mit einer etwa 5- bis 50%igen Lösung von Dimethylamin, Diethylamin oder Piperidin in DMF bei 15-30°.

Hydrogenolytisch entfernbare Schutzgruppen (z. B. CBZ oder Benzyl) können z. B. durch Behandeln mit Wasserstoff in Gegenwart eines Katalysators (z. B. eines Edelmetallkatalysators wie Palladium, zweckmäßig auf einem Träger wie Kohle) abgespalten werden. Als Lösungsmittel eignen sich dabei die oben angegebenen, insbesondere z. B. Alkohole wie Methanol oder Ethanol oder Amide wie DMF. Die Hydrogenolyse wird in der Regel bei Temperaturen zwischen etwa 0 und 100° und Drücken zwischen etwa 1 und 200 bar, bevorzugt bei 20-30° und 1-10 bar durchgeführt. Eine Hydrogenolyse der CBZ-Gruppe gelingt z. B. gut an 5 bis 10%igem Pd-C in Methanol oder mit Ammoniumformiat (anstelle von H₂) an Pd-C in Methanol/DMF bei 20-30°.

Verbindungen der Formel I können auch durch Umsetzung einer Verbindung der Formel II mit einer Aminoverbindung der Formel III unter für Peptidsynthesen an sich bekannten, kondensierenden Bedingungen, wie sie z.B. in Houben-Weyl, I.c., Bd. 1-5/II, S. 1-806 (1974) beschrieben sind, erhalten werden.

Die Reaktion gelingt vorzugsweise in Gegenwart eines Dehydratisierungsmittels, z. B. eines Carbodiiimids wie DCCl oder EDCI, ferner Propanphosphonsäureanhydrid (vgl. Angew.Chem. 92, 129 (1980)), Diphenylphosphorylazid oder 2-Ethoxy-N-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin, in einem inerten Lösungsmittel, z. B. einem halogenierten Kohlenwasserstoff wie Dichlormethan, einem Ether wie Tetrahydrofuran oder Dioxan, einem Amid wie DMF oder Dimethylacetamid, einem Nitril wie Acetonitril, oder in Gemischen dieser Lösungsmittel, bei Temperaturen zwischen etwa -10 und 40, vorzugsweise zwischen 0 und 30°.

Anstelle von II können auch geeignete reaktionsfähige Derivate dieser Stoffe in die Reaktion eingesetzt werden, z.B. solche, in denen reaktive Gruppen intermediär durch Schutzgruppen blockiert sind. Die Aminosäurederivate II können z.B. in Form ihrer aktivierten Ester verwendet werden, die zweckmäßig in situ gebildet werden, z. B. durch Zusatz von HOBt oder N-Hydroxysuccinimid.

Die Ausgangsstoffe der Formel II sind in der Regel neu. Sie können nach bekannten Methoden, z. B. den oben angegebenen Methoden der Peptidsynthese und der Abspaltung von Schutzgruppen, hergestellt werden.

In der Regel synthetisiert man zunächst geschützte Peptidester der Formel R'-M'-OR'', wobei M' dem am N-terminalen Ende um ein H-Atom reduzierten Rest M entspricht, z.B. BOC-M'-OMe oder Fmoc-M'-OMe. Diese werden zu Säuren der Formel R'-M'-OH, z.B. BOC-M'-OH oder Fmoc-M'-OH verseift und dann mit einer Verbindung der Formel III, die gegebenenfalls ebenfalls mit entsprechende Schutzgruppen an Positionen, die der Reaktion nicht zugänglich sein sollen, versehen ist, kondensiert.

Im Falle von Verbindungen der Formel III synthetisiert man ebenfalls Peptidester der Formel R'-Q-Z'-R'', wie z.B. BOC-Q-Z'-OMe oder Fmoc-Q-Z'-OMe, wobei Z'-NH- oder -O- bedeutet und spaltet dann, ehe man die Kondensation zur Herstellung von Verbindungen der Formel I durchführt, die Schutzgruppe R' auf bekannte Weise, z.B. Fmoc durch Behandlung mit einer Piperidin/DMF-Lösung, ab.

5 Besonders vorteilhaft können die neueren Methoden der Peptidsynthese nach modifizierten Merrifield-Techniken und unter Verwendung von Peptidsynthesegeräten, wie sie z.B. in Peptides, Proc. 8th Am. Pept. Symp., Eds. V. Hruby und D.H. Rich, Pierce Comp. III, p. 73-77 (1983) von A. Jonczyk und J. Meienhofer (Fmoc-Strategie) beschrieben sind oder die in Angew. Chem. 104, 375-391 (1992) dargestellten Techniken, Verwendung finden. Derartige Methoden sind an sich bekannt und deren Schilderung daher an dieser Stelle
10 entbehrlich.

Eine Base der Formel I kann mit einer Säure in das zugehörige Säureadditionssalz übergeführt werden. Für diese Umsetzung kommen insbesondere Säuren in Frage, die physiologisch unbedenkliche Salze liefern. So können anorganische Säuren verwendet werden, z.B. Schwefelsäure, Salpetersäure, Halogenwasserstoffsäuren wie Chlorwasserstoffsäure oder Bromwasserstoffsäure, Phosphorsäuren wie Ortho-
15 phosphorsäure, Sulfaminsäure, ferner organische Säuren, insbesondere aliphatische, alicyclische, araliphatische, aromatische oder heterocyclische ein- oder mehrbasige Carbon-, Sulfon- oder Schwefelsäuren, z.B. Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Pivalinsäure, Diethylelessigsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Pimelinsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Milchsäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Benzoesäure, Salicylsäure, 2- oder 3-Phenylpropionsäure, Citronensäure, Gluconsäure, Ascorbinsäure, Nicotinsäure, Isonicotinsäure, Methan-
20 than- oder Ethansulfonsäure, Ethandisulfonsäure, 2-Hydroxyethansulfonsäure, Benzolsulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, Naphthalin-mono- und -disulfonsäuren, Laurylschwefelsäure. Salze mit physiologisch nicht unbedenklichen Säuren, z.B. Pikrate, können zur Isolierung und/oder Aufreinigung der Verbindungen der Formel I verwendet werden.

Andererseits kann eine Säure der Formel I durch Umsetzung mit einer Base in eines ihrer physiologisch unbedenklichen Metall- oder Ammoniumsalze übergeführt werden. Als Salze kommen dabei insbesondere die Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium- und Ammoniumsalze in Betracht, ferner substituierte Ammoniumsalze, z.B. die Dimethyl-, Diethyl- oder Diisopropylammoniumsalze, Monoethanol-, Diethanol- oder Triethanolammoniumsalze, Cyclohexyl-, Dicyclohexylammoniumsalze, Dibenzylethylendiammoniumsalze, weiterhin z.B. Salze mit N-Methyl-D-glucamin oder mit Arginin oder Lysin.

30 Ferner können die neuen Verbindungen der Formel I als Integrinliganden zur Herstellung von Säulen für die Affinitätschromatographie zur Reindarstellung von Integrinen verwendet werden.

Der Ligand, d.h. ein Peptidderivat der Formel I, wird dabei über Ankerfunktionen an einen polymeren Träger kovalent gekuppelt.

Als polymere Trägermaterialien eignen sich die an sich in der Peptidchemie bekannten polymeren
35 festen Phasen mit vorzugsweise hydrophilen Eigenschaften, beispielsweise quervernetzter Polyzucker, wie Zellulose, Sepharose oder Sephadex®, Acrylamide, Polymere auf Polyethylenglykollbasis oder Tentakelpolymere®.

Als Ankerfunktionen, die mit den polymeren Trägern verknüpft sind, eignen sich vorzugsweise lineare Alkylketten mit 2-12 C-Atomen, die mit einem Ende direkt an das Polymer gebunden sind und am
40 anderen Ende eine funktionelle Gruppe, wie z.B. Hydroxy, Amino, Mercapto, Maleinimido oder -COOH aufweisen und dazu geeignet sind, mit dem C- oder N-terminalen Abschnitt des jeweiligen Peptids verknüpft zu werden.

Dabei ist es möglich, daß das Peptid direkt oder ebenfalls über eine zweite Ankerfunktion mit dem Anker des Polymers verbunden ist. Ferner ist es möglich, daß Peptide, die Aminosäurereste mit funktionalisierten Seitenketten enthalten, über diese mit der Ankerfunktion des Polymers verbunden werden.
45

Darüber hinaus können bestimmte Aminosäurereste, die Bestandteil der Peptide der Formel I sind, in ihren Seitenketten derart modifiziert werden, daß sie zur Verankerung über z.B. SH-, OH-, NH₂- oder COOH-Gruppen mit dem Anker des Polymers zur Verfügung stehen.

Möglich sind hierbei ungewöhnliche Aminosäuren, wie z.B. Phenylalaninderivate, die in 4-Position des Phenylrings eine Mercapto-, Hydroxy-, Amino- oder Carboxyalkylkette tragen, wobei die funktionelle Gruppe
50 sich am Ende der Kette befindet..

Beispiele für Aminosäurereste, deren Seitenkette direkt als Ankerfunktion dienen kann, sind z.B. Lys, Orn, Arg, Dab, Asp, Asn, Glu, Gln, Ser, Thr, Cys, Cit oder Tyr.

Beispiele für N-terminale Anker sind Reste, wie z.B. -CO-C_nH_{2n}-NH₂, -CO-C_nH_{2n}-OH, -CO-C_nH_{2n}-SH
55 oder -CO-C_nH_{2n}-COOH mit n = 2-12, wobei die Länge der Alkylkette nicht kritisch ist und diese gegebenenfalls auch z.B. durch entsprechende Aryl- oder Alkylarylreste teilweise oder vollständig ersetzt werden kann.

C-terminale Anker können beispielsweise $-O-C_nH_{2n}-SH$, $-O-C_nH_{2n}-OH$, $-O-C_nH_{2n}-NH_2$, $-O-C_nH_{2n}-COOH$, $-NH-C_nH_{2n}-SH$, $-NH-C_nH_{2n}-OH$, $-NH-C_nH_{2n}-NH_2$ oder $-NH-C_nH_{2n}-COOH$ sein, wobei für n sowie für die Alkylenkette das bereits im vorhergehenden Abschnitt gesagte gilt.

Die N- und C-terminalen Anker können auch als Ankerbaustein für eine bereits funktionalisierte Seitenkette eines Aminosäurerests dienen. Es kommen hier beispielsweise Aminosäurereste wie Lys($CO-C_5H_{10}-NH_2$), Asp($NH-C_3H_6-COOH$) oder Cys($C_3H_6-NH_2$) in Frage, wobei der Anker immer an die funktionelle Gruppe der Seitenkette gebunden ist.

Die Herstellung der Materialien für die Affinitätschromatographie erfolgt unter Bedingungen wie sie für die Kondensation von Aminosäuren üblich und an sich bekannt sind und bereits im Abschnitt zur Herstellung der Verbindungen der Formel I geschildert wurden, bzw. in Pierce, Immuno Technology Catalog & Handbook (1990) beschrieben sind.

Die neuen Verbindungen der Formel I und ihre physiologisch unbedenklichen Salze können zur Herstellung pharmazeutischer Präparate verwendet werden, indem man sie zusammen mit mindestens einem Träger- oder Hilfsstoff und, falls erwünscht, zusammen mit einem oder mehreren weiteren Wirkstoff(en) in eine geeignete Dosierungsform bringt. Die so erhaltenen Zubereitungen können als Arzneimittel in der Human- oder Veterinärmedizin eingesetzt werden. Als Trägersubstanzen kommen organische oder anorganische Stoffe in Frage, die sich für die enterale (z.B. orale oder rektale), parenterale (z.B. intravenöse Injektion) oder lokale (z.B. topische, dermale, ophthalmische oder nasale) Applikation oder für eine Applikation in Form eines Inhalations-Sprays eignen und mit den neuen Verbindungen nicht reagieren, beispielsweise Wasser oder wässrige isotonische Kochsalzlösung, niedere Alkohole, pflanzliche Öle, Benzylalkohole, Polyethylenglykole, Glycerintriacetat und andere Fettsäureglyceride, Gelatine, Sojalecithin, Kohlehydrate wie Lactose oder Stärke, Magnesiumstearat, Talk, Cellulose, Vaseline. Zur oralen Anwendung dienen insbesondere Tabletten, Dragees, Kapseln, Sirupe, Säfte oder Tropfen; von Interesse sind speziell Lacktabletten und Kapseln mit magensaftresistenten Überzügen bzw. Kapselhüllen. Zur rektalen Anwendung dienen Suppositorien, zur parenteralen Applikation Lösungen, vorzugsweise ölige oder wässrige Lösungen, ferner Suspensionen, Emulsionen oder Implantate. Zur topischen Anwendung eignen sich z.B. Lösungen, die in Form von Augentropfen verwendet werden können, ferner z. B. Suspensionen, Emulsionen, Cremes, Salben oder Komprimat. Für die Applikation als Inhalations-Spray können Sprays verwendet werden, die den Wirkstoff entweder gelöst oder suspendiert in einem Treibgas oder Treibgasgemisch (z.B. CO_2 oder Fluorchlorkohlenwasserstoffen bzw. geeignete Ersatzstoffe) enthalten. Zweckmäßig verwendet man den Wirkstoff dabei in mikronisierter Form, wobei ein oder mehrere zusätzliche physiologisch verträgliche Lösungsmittel zugegen sein können, z.B. Ethanol. Inhalationslösungen können mit Hilfe üblicher Inhalatoren verabfolgt werden. Die neuen Verbindungen können auch lyophilisiert und die erhaltenen Lyophilisate z.B. zur Herstellung von Injektionspräparaten verwendet werden. Die Injektionen können dabei als Bolus oder als kontinuierliche Infusion (z.B. intravenös, intramuskulär, subcutan oder intrathecal) gegeben werden. Die angegebenen Zubereitungen können sterilisiert sein und/oder Hilfsstoffe wie Konservierungs-, Stabilisierungs und/oder Netzmittel, Emulgatoren, Salze zur Beeinflussung des osmotischen Druckes, Puffersubstanzen, Farb- und/oder Aromastoffe enthalten. Sie können, falls erwünscht, auch einen oder mehrere weitere Wirkstoffe enthalten, z. B. ein oder mehrere Vitamine.

Die erfindungsgemäßen Substanzen können in der Regel in Analogie zu anderen bekannten, im Handel befindlichen Peptiden, insbesondere aber in Analogie zu den in der US-A-4 472 305 beschriebenen Verbindungen verabreicht werden, vorzugsweise in Dosierungen zwischen etwa 0,05 und 500, insbesondere zwischen 0,5 und 100 mg pro Dosierungseinheit. Die tägliche Dosierung liegt vorzugsweise zwischen etwa 0,01 und 2 mg/kg Körpergewicht. Die spezielle Dosis für jeden bestimmten Patienten hängt jedoch von den verschiedensten Faktoren ab, beispielsweise von der Wirksamkeit der eingesetzten speziellen Verbindung, vom Alter, Körpergewicht, allgemeinen Gesundheitszustand, Geschlecht, von der Kost, vom Verabfolgungszeitpunkt und -weg, von der Ausscheidungsgeschwindigkeit, Arzneistoffkombination und Schwere der jeweiligen Erkrankung, welcher die Therapie gilt. Die parenterale Applikation ist bevorzugt.

Vor- und nachstehend sind alle Temperaturen in °C angegeben. In den nachfolgenden Beispielen bedeutet "übliche Aufarbeitung": Man gibt, falls erforderlich, Wasser hinzu, neutralisiert, extrahiert mit Ether oder Dichlormethan, trennt ab, trocknet die organische Phase über Natriumsulfat, filtriert, dampft ein und reinigt durch Chromatographie an Kieselgel und/oder Kristallisation. RZ = Retentionszeit (Minuten) bei HPLC an Lichrosorb RP® select B (250-4,7 µm)-Säule, Laufmittel: 0,3 % TFA in Wasser; Isopropanolgradient von 0-80 Vol% in 50 Min. bei 1 ml/Min. Fluß und Detektion bei 215 nm. M⁺ = Molekular-Peak im Massenspektrum, erhalten nach der "Fast Atom Bombardment"-Methode (FAB), steht in der Regel für M⁺ + H, also die um 1 Masseneinheit erhöhte Masse der jeweiligen Verbindung.

Beispiel 1

2,2 g BOC-Asp-Gly-OH werden in einer Mischung aus 150 ml Dichlormethan und 20 ml DMF gelöst, auf 0° abgekühlt und anschließend mit 0,5 g DCCl, 0,3 g HOBt, 0,23 ml N-Methylmorpholin und 1 Äquivalent H-Arg-His-Asp-Leu-OMe (beide Peptide sind nach Methoden der modifizierten Merrifield-Techniken erhältlich) versetzt. Es wird 20 Stunden bei 0° und 6 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Man engt die Reaktionsmischung ein, behandelt sie mit einem Mischbett-Ionenaustauscher und gibt sie in eine wäßrige NaHCO₃-Lösung. Das ausfallende Produkt wird abgesaugt und mit Wasser gewaschen. Nach Waschen mit Ethylacetat/Petrolether erhält man BOC-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe.

10 Analog erhält man durch Kondensation von H-Arg-His-Asp-Leu-OMe

mit BOC-Gly-OH:

BOC-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Asn-Gly-Asp-Gly-OH:

BOC-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

15 mit BOC-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-OH:

BOC-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-OH:

BOC-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Lys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-OH:

20 BOC-Lys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Tyr-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-OH:

BOC-Tyr-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Ala-Asp-Gly-OH:

BOC-Ala-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

25 mit BOC-D-Ala-Asp-Gly-OH:

BOC-D-Ala-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Gly-Asp-Ala-OH:

BOC-Gly-Asp-Ala-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Gly-D-Asp-Gly-OH:

30 BOC-Gly-D-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Gly-Asp-D-Ala-OH:

BOC-Gly-Asp-D-Ala-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Gly-Asp-OH:

BOC-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

35 mit BOC-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-OH:

BOC-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-OH:

BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-OH:

40

BOC-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

45

mit BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-OH:

BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

mit BOC-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-OH:

50

BOC-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe;

55 mit BOC-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-OH:

BOC-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-
OMe.

5

Beispiel 2

Analog Beispiel 1 erhält man durch Umsetzung von BOC-Gly-Asp-Gly-OH

- 10 mit H-Arg-His-Asp-OMe:
BOC-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-OMe;
mit H-Arg-His-OMe:
BOC-Gly-Asp-Gly-Arg-His-OMe;
mit H-Arg-His-Asn-Leu-OMe:
15 BOC-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asn-Leu-OMe;
mit H-Arg-Gly-Asp-Leu-OMe:
BOC-Gly-Asp-Gly-Arg-Gly-Asp-Leu-OMe;
mit H-Arg-His-D-Asp-Leu-OMe:
BOC-Gly-Asp-Gly-Arg-His-D-Asp-Leu-OMe;
20 mit H-Arg-D-His-Asp-Leu-OMe:
BOC-Gly-Asp-Gly-Arg-D-His-Asp-Leu-OMe;
mit H-D-Arg-His-Asp-Leu-OMe:
BOC-Gly-Asp-Gly-D-Arg-His-Asp-Leu-OMe.
Analog Beispiel 1 erhält man durch Umsetzung von BOC-Gly-Asn-Gly-OH
25 mit H-Arg-His-Asn-Leu-OMe:
BOC-Gly-Asn-Gly-Arg-His-Asn-Leu-OMe;
mit H-Arg-His-Asp-Leu-OMe:
BOC-Gly-Asn-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe.

30 Beispiel 3

Analog Beispiel 1 erhält man durch Kondensation von:

- BOC-Leu-Asp-His-Arg-OH mit H-Gly-Asp-Gly-OEt:
BOC-Leu-Asp-His-Arg-Gly-Asp-Gly-OEt;
35 BOC-Lys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-Leu-OH mit H-His-Asp-Gly-OEt:
BOC-Lys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-Leu-His-Asp-Gly-OEt;
BOC-Lys-Pro-Ser-Asp-OH mit H-Gly-Arg-Gly-OEt:
BOC-Lys-Pro-Ser-Asp-Gly-Arg-Gly-OEt;
BOC-Arg-His-OH mit H-Asp-Leu-OMe:
40 BOC-Arg-His-Asp-Leu-OMe;
BOC-D-Lys-D-Pro-D-Ser-D-Asp-D-Gly-OH mit H-D-Arg-D-Gly-OMe:
BOC-D-Lys-D-Pro-D-Ser-D-Asp-D-Gly-D-Arg-D-Gly-OMe;
BOC-Leu-Asp-His-OH mit H-Arg-Gly-Asp-OMe:
BOC-Leu-Asp-His-Arg-Gly-Asp-OMe;
45 BOC-Leu-Asp-His-OH mit H-Arg-Gly-OMe:
BOC-Leu-Asp-His-Arg-Gly-OMe;
BOC-Gly-Arg-His-OH mit H-Asp-Leu-Leu-OMe:
BOC-Gly-Arg-His-Asp-Leu-Leu-OMe;
BOC-Arg-Gly-OH mit H-Asp-Leu-OMe:
50 BOC-Arg-Gly-Asp-Leu-OMe;
BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-OH mit H-Leu-His-Gly-OMe:
BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-Leu-His-Gly-OMe;
BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-OH mit H-His-Asp-Ile-OMe:
BOC-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Ile-OMe.

55

Beispiel 4

1,3 g BOC-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe werden in 60 ml Methanol gelöst, mit 1,5 ml 2 N NaOH-Lösung versetzt und 4 Stunden bei 25° gerührt. Nach Entfernung des Lösungsmittels wird der Rückstand in Wasser aufgenommen, der pH-Wert durch Zugabe von verdünnter HCl auf 3 eingestellt und mit Ethylacetat extrahiert. Der Extrakt wird über Na₂SO₄ getrocknet. Nach Entfernung des Lösungsmittels erhält man BOC-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH, welches man in 20 ml 2 N HCl auf Dioxanbasis aufnimmt und 2 Stunden bei Raumtemperatur rührt. Die Reaktionsmischung wird zur Trockne eingeeengt und der Rückstand durch HPLC gereinigt. Man erhält H-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 9,5; M⁺ 712.

0,5 g
nuten
-Asp-

Analog erhält man durch Entfernung der Schutzgruppen ausgehend von den Verbindungen aus Beispiel 1:

- H-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 9,2; M⁺ 597;
- H-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,3; M⁺ 883;
- H-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 12,9; M⁺ 982;
- H-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 13,4; M⁺ 1097;
- H-Lys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,5; M⁺ 1011;
- H-Tyr-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 13,8; M⁺ 1046;
- H-Ala-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 10,7; M⁺ 783;
- H-D-Ala-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,1; M⁺ 783;
- H-Gly-Asp-Ala-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,0; M⁺ 784;
- H-Gly-D-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 10,5; M⁺ 770;
- H-Gly-Asp-D-Ala-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,9; M⁺ 784;
- H-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 8,1; M⁺ 712;
- Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 27,7; M⁺ 1171;
- Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,7; M⁺ 929;
- Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 27; M⁺ 1228;
- Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,7; M⁺ 987;
- Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 12,7; M⁺ 1415;
- Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH.

Asp-Leu-

Beispiel 5

Analog Beispiel 4 erhält man durch Verseifung und Abspaltung der BOC-Schutzgruppen ausgehend von Verbindungen aus Beispiel 2:

- H-Asp-Gly-Arg-His-Asp-OH; RZ = 3,5; M⁺ 656;
- H-Asp-Gly-Arg-His-OH; RZ = 3,5; M⁺ 541;
- H-Asp-Gly-Arg-His-Asn-Leu-OH; RZ = 11,2; M⁺ 769;
- H-Asp-Gly-Arg-Gly-Asp-Leu-OH; RZ = 11,4; M⁺ 689;
- H-Asp-Gly-Arg-His-D-Asp-Leu-OH; RZ = 11,7; M⁺ 769;
- H-Asp-Gly-Arg-D-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,3; M⁺ 769;
- H-Asp-Gly-D-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 10,9; M⁺ 769.
- H-Asn-Gly-Arg-His-Asn-Leu-OH; RZ = 10,8; M⁺ 767;
- H-Asn-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH; RZ = 11,8; M⁺ 768.

gerührt.
if 0° ab.
1 1,0 ml
hrt. Nach
3 Produkt
• gerührt

Beispiel 6

Analog Beispiel 4 erhält man ausgehend von den Verbindungen aus Beispiel 3 durch Verseifung und Abspaltung der BOC-Schutzgruppen:

- H-Asp-His-Arg-Gly-Asp-Gly-OH; RZ = 11,1; M⁺ 769;
- H-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-Leu-His-Asp-Gly-OH; RZ = 9,8; M⁺ 1011;
- H-Pro-Ser-Asp-Gly-Arg-Gly-OH; RZ = 3,5; M⁺ 716;
- H-His-Asp-Leu-OH; RZ = 8,0; M⁺ 540;
- H-D-Pro-D-Ser-D-Asp-D-Gly-D-Arg-D-Gly-OH; RZ = 24,7; M⁺ 938;
- H-Asp-His-Arg-Gly-Asp-OH; RZ = 11,5; M⁺ 712;
- H-Asp-His-Arg-Gly-OH; RZ = 3,9; M⁺ 597;
- H-Arg-His-Asp-Leu-Leu-OH; RZ = 15,3; M⁺ 710;
- H-Gly-Asp-Leu-OH; RZ = 7,0; M⁺ 460;
- H-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-Leu-His-Gly-OH; RZ = 7,2; M⁺ 871;

- mit Fmoc-Gly-D-Asp-Gly-OH:
 Fmoc-Gly-D-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;
 mit Fmoc-Gly-Asp-D-Ala-OH:
 Fmoc-Gly-Asp-D-Ala-Arg-His-Asp-Leu-OH;
 5 mit Fmoc-Gly-Asp-OH:
 Fmoc-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH;
 mit Fmoc-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-OH:
 Fmoc-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH;
 mit Fmoc-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-OH:
 10 Fmoc-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH;
 mit Fmoc-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-OH:
 Fmoc-Cys(Trt)-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;
 mit Fmoc-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-OH:
 Fmoc-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;
 15 mit Fmoc-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-OH:

Fmoc-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-
 20 Leu-OH;

mit Fmoc-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-OH:
 Fmoc-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH.

25 Beispiel 10

0,7 g BOC-Gly-Asp-Gly-Arg(BOC)-His-Asp-Leu-OH werden in 100 ml Dichlormethan gelöst, mit 1,4 Äquivalenten MBHA-Harz versetzt und 24 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach Entfernung des Lösungsmittels erhält man BOC-Gly-Asp-Gly-Arg(BOC)-His-Asp-Leu-MBHA-Harz, welches man in 20 ml 2
 30 N HCl auf Dioxanbasis aufnimmt und 2 Stunden bei Raumtemperatur rührt. Anschließend Behandlung mit TFA liefert H-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-NH₂; RZ = 8,8; M⁺ 768.

Analog erhält man durch Umsetzung mit MBHA-Harz die folgenden Peptidamide:

- aus BOC-Arg(BOC)-His-Asp-Leu-OH:
 H-Arg-His-Asp-Leu-NH₂; RZ = 5,4; M⁺ 539;
 35 aus BOC-Arg(BOC)-Gly-Asp-Leu-OH:
 H-Arg-Gly-Asp-Leu-NH₂; RZ = 4,7; M⁺ 459;
 aus BOC-Gly-Asp-Gly-Arg(BOC)-Gly-Asp-Leu-OH:
 H-Gly-Asp-Gly-Arg-Gly-Asp-Leu-NH₂.

40 Beispiel 11

Analog Beispiel 7 erhält man ausgehend von H-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-NH₂ durch Acetylierung des Peptids H₃C-CO-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-NH₂; RZ = 12,4; M⁺ 810.

Analog erhält man:

- 45 aus H-Arg-His-Asp-Leu-NH₂:
 H₃C-CO-Arg-His-Asp-Leu-NH₂; RZ = 11,1; M⁺ 581;
 aus H-Arg-Gly-Asp-Leu-NH₂:
 H₃C-CO-Arg-Gly-Asp-Leu-NH₂; RZ = 11,3; M⁺ 501.

50 Beispiel 12

80 mg H-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH werden drei- bis viermal in 0,01 m HCl gelöst und nach jedem Lösevorgang gefriergetrocknet. Anschließend Reinigung durch HPLC liefert H-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH x HCl.

55 Analog erhält man

- aus H-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH durch Behandlung mit TFA:
 H-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH x TFA; RZ = 11,8; M⁺ 1198.

Beispiel 13

Zur Herstellung von Affinitätsphasen suspendiert man 0,9g N-Maleinimido-C₅H₁₀-CO-NH-C₃H₆-Polymer [erhältlich durch Kondensation von N-Maleinimido-C₅H₁₀-COOH mit H₂N-C₃H₆-Polymer] in 10 ml 0,1 M Natriumphosphatpuffer bei pH 7 und fügt bei 4 • 1 Äquivalent H-Cys-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH hinzu. Man rührt 4 Stunden bei gleichzeitiger Erwärmung der Reaktionsmischung auf Raumtemperatur, filtriert den festen Rückstand ab und wäscht zweimal mit je 10 ml Pufferlösung (pH 7) und anschließend dreimal mit je 10 ml Wasser. Man erhält H-Cys[3-(N-Maleinimido-C₅H₁₀-CO-NH-C₃H₆-Polymer)]-Gly-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH.

Beispiel 14

Analog Beispiel 1 erhält man durch Kondensation von Polymer-O-C₃H₆-NH₂ [im Handel erhältlich] und HOOC-C₄H₈-CO-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe [erhältlich durch Kondensation von Adipinsäure mit H-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe unter den genannten Bedingungen] die folgende polymere Phase: Polymer-O-C₃H₆-NH-CO-C₄H₈-CO-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OMe. Hieraus erhält man durch Verseifung in Methanol mit 2 N NaOH-Lösung gemäß Bsp. 4 Polymer-O-C₃H₆-NH-CO-C₄H₈-CO-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH.

Die nachstehenden Beispiele betreffen pharmazeutische Zubereitungen.

Beispiel A: Injektionsgläser

Eine Lösung von 100 g eines Wirkstoffes der Formel I und 5 g Dinatriumhydrogenphosphat in 3 l zweifach destilliertes Wasser mit 2 n Salzsäure auf pH 6,5 eingestellt, steril filtriert, in Injektionsgläser abgefüllt, unter sterilen Bedingungen lyophilisiert und steril verschlossen. Jedes Injektionsglas enthält 5 mg Wirkstoff.

Beispiel B: Suppositorien

Man schmilzt ein Gemisch von 20 g eines Wirkstoffes der Formel I mit 100 g Sojolecithin und 1400 g Kakaobutter, gießt in Formen und läßt erkalten. Jedes Suppositorium enthält 20 mg Wirkstoff.

Beispiel C: Lösung

Man bereitet eine Lösung aus 1 g eines Wirkstoffes der Formel I, 9,38 g NaH₂PO₄ × 2 H₂O, 28,48 g Na₂HPO₄ × 12 H₂O und 0,1 g Benzalkoniumchlorid in 940 ml zweifach destilliertem Wasser. Man stellt auf pH 6,8 ein, füllt auf 1 l auf und sterilisiert durch Bestrahlung. Diese Lösung kann in Form von Augentropfen verwendet werden.

Beispiel D: Salbe

Man mischt 500 mg eines Wirkstoffes der Formel I mit 99,5 g Vaseline unter aseptischen Bedingungen.

Beispiel E: Tabletten

Ein Gemisch von 1 kg Wirkstoff der Formel I, 4 kg Lactose, 1,2 kg Kartoffelstärke, 0,2 kg Talk und 0,1 kg Magnesiumstearat wird in üblicher Weise zu Tabletten verpreßt, derart, daß jede Tablette 10 mg Wirkstoff enthält.

Beispiel F: Dragees


Analog Beispiel E werden Tabletten gepreßt, die anschließend in üblicher Weise mit einem Überzug aus Saccharose, Kartoffelstärke, Talk, Tragant und Farbstoff überzogen werden.

Beispiel G: Kapseln

2 kg Wirkstoff der Formel I werden in üblicher Weise in Hartgelatine-kapseln gefüllt, so daß jede Kapsel 20 mg des Wirkstoffs enthält.

Beispiel H: Ampullen

Eine Lösung von 1 kg Wirkstoff der Formel I in 60 l zweifach destilliertem Wasser wird steril filtriert, in Ampullen abgefüllt, unter sterilen Bedingungen lyophilisiert und steril verschlossen. Jede Ampulle enthält 10 mg Wirkstoff.

Patentansprüche**1. Lineare Peptide der Formel I**

worin

X H, Acyl mit 1-10 C-Atomen, H-Asn, H-Val-Asn, H-Asp-Val-Asn, Fmoc-Gly-Gly, H-Lys-Gly-Gly, H-Lys-Pro, H-Tyr-Gly-Gly, H-Cys-Gly-Gly, H-Cys(Trt)-Gly-Gly, H-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn oder H-Thr-Asp-Val-Asn,

A, B und C jeweils unabhängig voneinander fehlen oder jeweils einen Aminosäurerest, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus Ala, Arg, Asn, Asp, Asp(OR), Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Lys(Ac), Lys(AcNH₂), Lys(AcSH), Met, Orn, Phe, 4-Hal-Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr oder Val, wobei die genannten Aminosäurereste auch derivatisiert sein können,

E Gly, His oder Leu-His,

G fehlt oder Asp oder Asn,

L fehlt oder Gly, Ile, Leu oder Leu-Leu,

Z NH₂ oder OH,

Hal F, Cl, Br, I und

Ac Alkanoyl mit 1-10 C-Atomen

bedeuten,

sowie deren physiologisch unbedenklichen Salze.

2. Ein Enantiomer oder ein Diastereomer einer Verbindung der Formel I gemäß Anspruch 1.**3.**

(a) H-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;

(b) H-Thr-Asp-Val-Asn-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;

(c) H-Lys-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;

(d) Fmoc-Gly-Gly-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;

(e) CH₃-CO-Gly-Asp-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH;

(f) H-Cys-Gly-Gly-Asp-Arg-His-Asp-Leu-OH;

(g) H-Gly-Arg-His-Asp-Leu-OH.

4. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 oder eines ihrer Salze, dadurch gekennzeichnet, daß man sie aus einem ihrer funktionellen Derivate durch Behandeln mit einem solvolysierenden oder hydrogenolysierenden Mittel in Freiheit setzt oder daß man eine Verbindung der Formel II

worin

Z die angegebene Bedeutung besitzt und

M

(a) X, aber nicht Wasserstoff, Fmoc-Gly, H-Lys-Gly, H-Lys, H-Tyr-Gly, H-Asp-Val, H-Tyr, H-Val, H-Asp, H-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp-Val, H-Cys-Gly-Gly-Thr-Asp, H-Cys-Gly-Gly-Thr, H-Cys-Gly-Gly, H-Cys-Gly, H-Cys, H-Cys(Trt)-Gly, H-Cys(Trt), H-Thr-Asp-Val, H-Thr-Asp oder H-Thr,

(b) X-A,

(c) X-A-B,

(d) X-A-B-C,

- (e) X-A-B-C-Arg,
- (f) X-A-B-C-Arg-E oder
- (g) X-A-B-C-Arg-E-G

bedeutet,
mit einer Aminoverbindung der Formel III

H-Q-Z III

worin

Z die angegebene Bedeutung besitzt und
Q

- (a) H-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Pro-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Gly-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Gly-Gly-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Thr-Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L, H-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L oder H-Gly-Gly-Thr-Asp-Val-Asn-A-B-C-Arg-E-G-L,
- (b) H-B-C-Arg-E-G-L,
- (c) H-C-Arg-E-G-L,
- (d) H-Arg-E-G-L,
- (e) H-E-G-L,
- (f) H-G-L oder
- (g) H-L

bedeutet,
umsetzt,

und/oder daß man gegebenenfalls eine freie Aminogruppe acyliert und/oder eine Verbindung der Formel I durch Behandeln mit einer Säure oder Base in eines ihrer Salze überführt.

5. Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Zubereitungen, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung der Formel I nach Anspruch 1 und/oder eines ihrer physiologisch unbedenklichen Salze zusammen mit mindestens einem festen, flüssigen oder halbflüssigen Träger- oder Hilfsstoff in eine geeignete Dosierungsform bringt.
6. Pharmazeutische Zubereitung, gekennzeichnet durch einen Gehalt an mindestens einer Verbindung der allgemeinen Formel I nach Anspruch 1 und/oder einem ihrer physiologisch unbedenklichen Salze.
7. Verwendung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 1 oder von deren physiologisch unbedenklichen Salzen zur Herstellung eines Arzneimittels zur Bekämpfung von Krankheiten.
8. Verwendung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 1 oder von deren physiologisch unbedenklichen Salzen bei der Bekämpfung von Krankheiten.
9. Verwendung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 1 zur Herstellung von immobilisierten Liganden für die Affinitätssäulenchromatographie.
10. Verwendung von Verbindungen der Formel I nach Anspruch 1 zur Reinigung von Integrinen durch Affinitätschromatographie.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-
übereinkommens für das weitere Verfahren als
europäischer Recherchenbericht gilt

EP 94 10 4395

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	WO-A-91 07977 (SCRIPPS CLINIC AND RESEARCH FOUNDATION) 13. Juni 1991 * das ganze Dokument * ---	1-10	C07K5/06 C07K5/08 C07K5/10 C07K7/06 C07K7/08 A61K37/02
X	INT. J. ARTIF. ORGANS Bd. 15, Nr. 12, Dezember 1992, MILAN, ITALY Seiten 737 - 745 S. ITO ET AL. 'Peptidyl antithrombogenic agents for extracorporeal blood circulation' * das ganze Dokument * ---	1-10	
A	WO-A-89 07613 (DANA-FARBER CANCER INSTITUTE) 24. August 1989 siehe Absatz 6 .1. 14 auf Seite 48 ---	1-10	
A	TIBS TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES Bd. 16, Nr. 7, Juli 1991, CAMBRIDGE EN Seiten 246 - 250 S. E. D'SOUZA ET AL. 'Arginyl-glycyl-aspartic acid (RGD); a cell adhesion motif' * das ganze Dokument * ---	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			C07K A61K
-/--			
UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE			
<p>Nach Auffassung der Recherchem Abteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung den Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens so wenig, daß es nicht möglich ist, auf der Grundlage einiger Patentansprüche sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen.</p> <p>Vollständig recherchierte Patentansprüche: Unvollständig recherchierte Patentansprüche: Nicht recherchierte Patentansprüche: Grund für die Beschränkung der Recherche:</p> <p>Siehe Ergänzungsblatt C</p>			
Recherchenort		Abschließende der Recherche	
DEN HAAG		18. Juli 1994	
		Prüfer	
		Masturzo, P	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN			
X : von besonderer Bedeutung als als betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenbericht			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überreicht am selben Dokument			



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 10 4395

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (InCL.5)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	
X	NATURE. Bd. 350, Nr. 6313 , 7. März 1991 , LONDON GB Seiten 66 - 68 S. E. D'SOUZA ET AL. 'A discrete sequence in a platelet integrin is involved in ligand recognition' * das ganze Dokument * -----	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIET (InCL.5)



EP 94 10 4395

-C-

Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 7,8 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers beziehen, wurde die Recherche aufgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindungen

UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE

vollständig recherchierte Patentansprüche: 1,2,4-10

unvollständig recherchierter Patentanspruch: 3

Da Anspruch 1 zu allgemein und unklar definiert wurde, und da keine gewisse Wirksamkeit der beanspruchten Verbindungen feststellbar war, wurde die Recherche, aus ökonomischen Gründen, auf den Inhalt des Anspruchs 1 nur insoweit als weiter von der Beschreibung, Seite 8, Zeilen 4-10 definiert, durchgeführt, d.h.:

A = Ala, Leu, Ser oder fehlt;

B = Asp oder Asn;

C = Ala, D-Ala, His, Gly;

E = Gly oder His;

G = Asp;

L = Leu;

Z = OH oder NH₂.

Der Umfang der Recherche war ähnlicherweise für die Ansprüche 2,4-10 eingeschränkt

? t 1/9

1/9/1

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI

(c)1999 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010036693

WPI Acc No: 94-304404/199438

XRAM Acc No: C94-138783

New oligopeptide inhibitors of integrin - for treatment and prevention of cardiovascular diseases, e.g. thrombosis, or tumours

Patent Assignee: MERCK PATENT GMBH (MERE)

Inventor: DIEFENBACH B; FELDING-HABERMANN B; JONCZYK A

Number of Countries: 024 Number of Patents: 010

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
EP 618225	A1	19941005	EP 94104395	A	19940321	C07K-005/06	199438 B
DE 4310632	A1	19941006	DE 4310632	A	19930401	C07K-007/06	199439
AU 9457984	A	19941006	AU 9457984	A	19940323	C07K-007/08	199441
NO 9401151	A	19941003	NO 941151	A	19940329	C07K-007/06	199442
CA 2120302	A	19941002	CA 2120302	A	19940330	C07K-007/06	199501
JP 6321988	A	19941122	JP 9496828	A	19940331	C07K-007/06	199506
CZ 9400703	A3	19941215	CZ 94703	A	19940325	C07K-007/06	199507
ZA 9402323	A	19950125	ZA 942323	A	19940331	C07K-000/00	199511
SK 9400384	A3	19950208	SK 94384	A	19940331	C07K-007/06	199525
CN 1099040	A	19950222	CN 94104073	A	19940330	C07K-007/06	199722

Priority Applications (No Type Date): DE 4310632 A 19930401

Cited Patents: 03Jnl.Ref; WO 8907613; WO 9107977

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing	Notes	Application	Patent
EP 618225	A1	G	19				

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

DE 4310632	A1	14
JP 6321988	A	14
ZA 9402323	A	40

Abstract (Basic): EP 618225 A

Linear peptides of formula (I) and their salts (also individual enantiomers and diastereomers) are new:

X-A-B-C-Arg-E-G-L-Z (I)

X = H, 1-10C acyl, H-Ra-Asn, Rb-Gly-Gly, H-Lys-Pro, or H-Rc-Thr-Asp-Val-Asn; Ra = nothing, Val or Asp-Val; Rb = Fmoc, H-Lys, H-Tyr, H-Cys or H-Cys(trityl); Rc = nothing or Cys-Gly-Gly; A, B and C are each absent or Ala, Arg, Asn, Asp, Asp(OR), Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Lys (Ac, AcNH₂ or SH), Met, Orn, Phe, 4-halo-Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr or Val, all opt. derivatised; E = Gly, His or Leu-His; G is absent or is Asp or Asn; L is absent or is Gly, Ile, Leu or Leu-Leu; Z = NH₂ or OH; Ac = 1-10C alkanoyl; R is not defined.

USE - (I) are inhibitors of integrin (esp. they inhibit interaction of the beta 3 integrin receptor with ligands) so can be used in human or veterinary medicine to treat e.g. thrombosis, cardiac infarct, arteriosclerosis, angina pectoris, tumours, osteoporosis, angiogenesis and restenosis after angioplasty.

(I) also stimulate wound healing; are antimicrobials (esp. used with implants, catheters etc.); and can be used to purify integrins by affinity chromatography.

ADVANTAGE - None given.

Dwg.0/0

Title Terms: NEW; OLIGOPEPTIDE; INHIBIT; TREAT; PREVENT; CARDIOVASCULAR; DISEASE; THROMBOSIS; TUMOUR

Derwent Class: B04

International Patent Class (Main): C07K-000/00; C07K-005/06; C07K-007/06;
C07K-007/08

International Patent Class (Additional): A61K-037/02; A61K-037/64;
A61K-038/08; A61K-038/10; C07K-001/00; C07K-003/20; C07K-005/08;
C07K-005/10; C07K-017/00; C07K-099-00

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): B04-C01; B07-D03; B07-D09; B10-A17; B14-F01B;
B14-F01D; B14-F04; B14-F07; B14-H01B; B14-L06; B14-N01

Chemical Fragment Codes (M1):

04 D011 D601 F012 F014 F423 F521 G010 G013 G019 G100 H1 H100 H101 H181
H182 H401 H441 H481 H498 H598 J0 J011 J012 J1 J111 J171 J172 J371 K0
L2 L250 M121 M129 M132 M210 M211 M271 M280 M281 M311 M312 M313 M314
M321 M332 M333 M340 M342 M343 M344 M349 M371 M381 M391 M423 M510
M511 M520 M521 M530 M531 M540 M620 M630 M640 M650 M710 M903 M904
P220 P522 P528 P617 P714 P814 P942 V911 V912 V913 9438-09904-N
9438-09905-N 9438-09906-N 9438-09907-N 9438-09908-N 9438-09909-N
9438-09910-N 9438-09911-N

Chemical Fragment Codes (M2):

01 C116 D011 D601 F014 F019 F521 F599 G010 G013 G100 H100 H101 H181
H182 H401 H441 H481 H498 H598 H600 H641 J0 J013 J014 J171 J172 J3
J372 J373 K0 K353 L2 L250 L299 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216
M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M262 M271 M280
M281 M282 M311 M312 M313 M314 M315 M321 M322 M331 M332 M333 M340
M342 M343 M349 M371 M381 M391 M392 M393 M412 M413 M414 M416 M510
M511 M520 M521 M522 M530 M531 M540 M620 M630 M640 M650 M710 M903
M904 P220 P522 P528 P617 P714 P814 P942 V0 V911 9438-09901-N
02 F014 F521 H100 H181 J0 J013 J014 J171 J172 J3 J372 J373 K0 L2 L250
M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225
M226 M231 M232 M233 M262 M280 M281 M311 M312 M314 M315 M321 M322
M332 M333 M340 M342 M343 M349 M371 M381 M391 M392 M393 M413 M416
M510 M520 M521 M530 M540 M620 M630 M640 M650 M710 M903 M904 P220
P522 P528 P617 P714 P814 P942 V0 V911 9438-09902-N
03 C116 D011 D601 F014 F521 G010 G013 G100 H1 H100 H101 H181 H182 H401
H441 H481 H498 H598 H600 H641 J0 J014 J171 J172 J3 J373 K0 K353 L2
L250 L299 M210 M211 M262 M271 M280 M281 M311 M312 M313 M314 M315
M321 M322 M331 M332 M333 M340 M342 M343 M349 M371 M381 M391 M392
M393 M412 M413 M414 M416 M510 M511 M520 M521 M530 M531 M540 M620
M630 M640 M650 M710 M903 M904 P220 P522 P528 P617 P714 P814 P942 V0
V911 9438-09903-N

Generic Compound Numbers: 9438-09901-N; 9438-09902-N; 9438-09903-N;
9438-09904-N; 9438-09905-N; 9438-09906-N; 9438-09907-N; 9438-09908-N;
9438-09909-N; 9438-09910-N; 9438-09911-N

?